

Echinopsis deserticola

(Werdermann) Friedrich & Rowley 1974

Sinónimo:

Cereus deserticola Werdermann 1929
Trichocereus desericola (werdemann) Backeberg
Trichocereus fulvilanus Ritter
Trichocereus spinibarbis (Otto) Ritter

Etimología:

deserticola: Que vive en parajes desérticos.

Distribución:

Región de Antofagasta, Atacama, Coquimbo. Habita de Tocopilla hasta el norte de La Serena.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Arbustivo, ramificándose basalmente, con tallos tendidos de 1 a 1,5 m. de largo y 4 a 7 cm. de diámetro, de color verde-grisáceo. **Costillas:** De 8 a 12, profundamente cortadas y obtusas. **Areolas:** Ovaladas, de hasta 12 mm. de largo y separadas a menos de 1,5 mm. de la siguiente. **Espinas:** De 1 a 6 las centrales y hasta 12 cm. de largo, robustas; a veces curvas; las radiales hasta 20, de 3 cm. de largo, más delgadas. **Raíz:** Fasciculadas. **Flores:** De 9 a 12 cm. de largo, blancas, salen desde cerca del ápice; el pericarpelo y el tubo floral están ligeramente cubiertos de una lanosidad oscura. **Fruto:** De 4 a 5 cm. de diámetro, de color verde oscuro, cubierto como el pericarpelo, acostillado en dirección longitudinal, de pulpa jugosa y aromática. **Semillas:** De 1,3 x 1 mm., con el hilum ampliamente ovalado, basalmente oblicuo, de color marrón.

Hábitat:

Hemos visto esta especie en variados hábitat, pero siempre cercanos a la costa y con la influencia de la camanchaca. La población más nortina que hemos visitado ha sido al sur de Antofagasta; aunque se han registrado desde Tocopilla. Crece en ciertos planos pero también en laderas empinadas, colgando y muy ramificados. Son tallos cortos, delgados y con espinas densas, lanudas y muy fuertes.

