

# Eriosyce taltalensis

## ssp. pygmaea

(Ritter) Ferryman 2004

### Sinónimo:

*Pyrrhocactus pygmaeus* Ritter 1963

*Pyrrhocactus gracilis* Ritter 1961

### Etimología:

*pygmaea*: Epíteto latino que significa enano.

### Distribución:

Región de Atacama. Habita principalmente en las cercanías de la costa, entre Caldera y Chañaral.

### Descripción de la planta:

**Cuerpo:** Aplanado, de 3 a 7 cm. de diámetro, gris verdoso. **Costillas:** De 10 a 13, hasta 16, tuberculadas y con los tubérculos con quilla. **Areolas:** De 2 a 4 mm. un tanto hundidas. **Espinas:** Negras o marrón, que se vuelven grises con el tiempo; las centrales de 1 a 4, de 1 a 4 cm. de largo, rectas a un tanto curvadas; de 7 a 12 radiales de 0,5 a 2 cm. de largo, más delgadas. **Raíz:** Pivotante, corta y cónica. **Flores:** De 3 cm. de largo; color variable, blanco-verdosas, blanca-rojizas o rosadas. **Pericarpelo y tubo floral** con lanosidad y cerdas en las areolas. **Fruto:** Rojizo. **Semilla:** De 0,9 mm., de color negro opaco.

### Hábitat:

Esta especie se encontró por las costas al sur de Chañaral, en lugares con influencia de la camanchaca. Son escasas y viven entre las rocas en laderas frente al mar, donde pueden aprovechar la escasa agua que condensa. Son muy variables en forma y floración; globulares, pequeñas y muchas veces permanecen enterradas, sólo sobresalen sus espinas que son muy rectas y aciculares.

