

Eriosyce subgibbosa

ssp. nigrihorrida

(Backeberg) Kattermann 2001

Sinónimo:
Neopterteria nigrihorrida Backeberg 1939

Etimología:
nigrihorrida: Compuesto por nigri= "negro" y horrida= "aspero" u "oscuro".

Distribución:
Región de Coquimbo. Habita desde el norte de Los Vilos hasta el norte de La Serena.

Descripción de la planta:
Cuerpo: Solitario, globular a alargado. Raramente sobre los 25 cm. de alto. Color verde intenso. **Costillas:** De 11 a 16. **Areolas:** Aovadas, blancas. **Espinas:** Aciculares, numerosas, derechas a algo curvadas. De 4 a 6 centrales de hasta 50 mm. de largo. De 11 a 16 radiales, rectas a recurvadas. De color negras a marrones cuando nuevas, grises a marrones claras con la edad. **Flores:** Múltiples, grandes, de hasta 5,5 cm. fucsias. **Fruto:** Ovoide, de verde a rosado. **Semilla:** Café, de 1,5 mm.

Hábitat:
Esta especie se ha encontrado en costas al sur de La Serena, en lugares con bastantes precipitaciones y vegetación. En épocas de brote es común verlas cubiertas por plantas trepadoras o rastreras. Estas plantas tienen una floración muy llamativa con una corona de flores que va abriendo paulatinamente. Se diferencia principalmente de *Eriosyce subgibbosa* ssp. *subgibbosa*, ya que sus espinas nuevas son oscuras, por eso el nombre de "nigrihorrida", y su fruto es de menor tamaño.

