


■ *Liolaemus frassinetti* Núñez, 2007

Nombre común: Lagarto de Cantillana. Lagarto leopardo de Cantillana.
Cantillana leopard lizard.



Etimología: Dedicada al profesor y destacado paleontólogo de invertebrados Daniel Frassinetti (1939 – 2010).

Reconocimiento: Es de tamaño grande y aspecto corpulento, las hembras son de menor tamaño. La cola llega a medir un poco más de una vez y media la longitud del resto de su cuerpo. La cabeza es levemente más larga que ancha y el cuello es tan ancho como esta y presenta algunos pliegues. Las extremidades son largas y esbeltas. Las escamas dorsales son ligeramente triangulares y con un mucrón casi imperceptible, de superficie quillada y disposición imbricada. Las escamas ventrales son de igual tamaño o levemente más grandes, redondeadas, lisas e imbricadas. La coloración es café pardusca, con una amplia mancha negra en los flancos que normalmente se extiende desde la axila hasta la zona media del cuerpo, muy marcada en machos, y además, presenta pequeños parches de escamas negras en todo el cuerpo. Tanto machos como hembras poseen la parte baja de los flancos de color amarillo ocre intenso. Los ejemplares machos presentan rayas transversales o escamas aisladas sobre el dorso de tonos celeste, verde claro y blancuzco. Los juveniles presentan pequeños parches circulares de escamas negras en todo el cuerpo, dispuestas en hileras transversales en el dorso, que le dan el aspecto moteado característico de los “lagartos leopardo”.

Distribución: Es endémica de la Cordillera de la Costa de Chile central, solo ha sido documentada en los Altos de Cantillana, entre 2.000 y 2.280 msnm.

Historia natural: Habita principalmente en rocas, en la planicie de la cima de los cerros de Cantillana, en sitios con escasa vegetación herbácea o arbustiva. Se asolea sobre rocas. Es esquiva, al verse amenazada se refugia bajo grandes rocas o en grietas. Es más activa en las horas de mayor temperatura. Es de reproducción probablemente vivípara.

