


■ *Liolaemus fitzgeraldi* Boulenger, 1899

Nombre común: Lagartija de Fitz Gerald. *Fitzgerald's lizard*



Etimología: Referido a Edward Arthur FitzGerald (1871 - 1931) alpinista de origen estadounidense quien dirigió la primera ascensión al monte Aconcagua.

Reconocimiento: Es de tamaño pequeño a mediano y aspecto esbelto. La longitud de la cola llega a medir un poco menos que el doble del resto de su cuerpo. Su cabeza es más larga que ancha y el cuello plegado más ancho que ésta. Las escamas del dorso son subhombreadas, de superficie quillada y disposición imbricada o subimbricada. Las escamas del vientre en cambio, son redondeadas, lisas y de disposición imbricada. Solo los machos de esta especie poseen dos a tres poros precloacales. La coloración general dorsal es café amarillento, oliváceo o rojizo y el patrón del dorso se caracteriza por un par de bandas supraoculares claras que convergen hacia la cola, entre las que se encuentra una serie de líneas negras que conforman un irregular diseño en forma de V semiextendida. La unión de estas líneas otorga un esbozo de línea vertebral más notorio hacia la cola. En los flancos hay numerosas barritas similares a las del dorso de color café oscuro o negro. El vientre es blanco grisáceo. Los ejemplares juveniles carecen de líneas oscuras en dorso y flancos o las presentan de manera casi imperceptible.

Distribución: Se encuentra en sectores de la Cordillera de los Andes de la Región de Valparaíso, al interior de Los Andes, entre 1.500 y 3.500 msnm. Hay registros en Portillo (Laguna del Inca), Río Blanco, Río Juncal y Río Colorado. También está presente en Argentina, en zonas andinas de Mendoza.

Historia natural: Habita en áreas de vegetación de baja estatura y laderas rocosas de cerros. Probablemente insectívora. Frente a amenazas, se oculta rápidamente bajo piedras. Su reproducción es vivípara.

