

TALADRADOR DEL ÑIRRE



Nombre científico:

Calydon submetallicum

Nombre común:

Taladrador del Ñirre

Clasificación:

Familia Cerambycidae

Características: Este escarabajo volador, se observa desde octubre a enero cuando frecuentan la floración de alguna de las especies de bosque nativo, como también los árboles recién cortados o muertos, en donde la hembra efectúa la postura. Las larvas de hábitos alimentarios xilófagos al nacer empiezan a horadar bajo la corteza y en el tronco mismo, en donde es posible observar galerías con aserrín compactado. Esta acción provoca un daño en la madera desvalorizándola, siendo por ello considerada una especie perjudicial de importancia económica.

Tamaño: Variable que oscila entre los 12 y 17 mm.

Aspecto físico: Este escarabajo de largas antenas presenta el cuerpo por encima de color negro con dibujos de amarillo claro con patas y abdomen azul metálico.

Biología: Es bastante frecuente de encontrar en el bosque nativo conformado especialmente por Nothofagus, cómo también en donde existan otras especies cómo el Quillay (*Quillaja saponaria*), Lingue (*Persea lingue*) y Canelo (*Drymis winteri*). Desde el nivel del mar hasta los 1.500 m.s.n.m.

Distribución geográfica: Desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos.