

LAGARTO NITIDO



Nombre científico:
Liolaemus nitidus.

Nombre común:
Lagarto nitido.

Clasificación:
Familia Liolaemidae.

Características: Especie saxícola, se considera una especie atrevida y agresiva. Presenta variación ontogénica de la dieta, siendo insectívoros en la etapa juvenil y luego pasando por una progresiva transición de omnívora a herbívora, con oviposturas de 5 a 6 huevos alrededor del mes octubre.

Tamaño: 10 cm.

Aspecto físico: Lagarto de tamaño grande, de aspecto robusto. Extremidades proporcionalmente cortas y cuello tan ancho como la cabeza. La cola es del doble de su cuerpo, aunque generalmente se encuentra regenerada en los animales adultos. Escamas del dorso imbricadas, muy lanceoladas y quilladas, dando al animal un aspecto de espinoso. Macho se caracteriza por presentar escamas oscuras, grisáceas u oliváceas, con los márgenes blanquecinos, determinando un diseño de líneas oscuras y claras dispuestas alternadamente, con tres poros precloacales. Flancos pigmentados de rojo o amarillo. Juveniles con barras transversales negras sobre un fondo pardo claro. Hembra adulta tiende a conservar los patrones juveniles.

Alimentación: Ovípara.

Biología: Laderas secas de los cerros de costas, valles y zonas precordilleranas, tanto costeros como andinos, desde 0 a 3.050 m.s.n.m.

Distribución geográfica: Desde la Región de Atacama hasta la Región del Biobío.

Estado de conservación: Vulnerable (Regto. Ley de Caza, 1998).