

Pteris chilensis Desv.

PTERIDACEAE

Hierba perenne con rizoma erecto, grueso, corto, escamoso. Hojas herbáceas, caducas en invierno; pecíolos aglomerados, de 3 a 4 mm de diámetro, de un tercio del largo total de la hoja, castaño oscuros en la base, hacia arriba más claros, escamosos en la base; lámina tripinnada hasta cuadripinnatífida, de 0,5 a 1 m de largo, subglabra, con pelos blanquecinos dispersos; pinnas inclinadas hacia el ápice formando un ángulo agudo con el raquis, triangular alargadas; últimos segmentos oblongos, de 10 a 25 mm de largo por 3 a 4 mm de ancho, separados unos de otros más o menos por el mismo espacio, margen dentado agudo, ápice obtuso o agudo, en la base más o menos adnados al raquis; venación libre. Soros sobre el nervio que recorre el borde de la lámina, formando cenosoros, sin indusio y protegidos por el margen revoluto membranoso, denticulado, de 0,5 mm de ancho.

Caracteres relevantes: Lámina tripinnada hasta cuadripinnatífida; últimos segmentos oblongos, con el margen dentado agudo. Soros que recorren el borde de la lámina, formando cenosoros, sin indusio y protegidos por el margen revoluto.

Endémica de Chile, se encuentra desde la provincia de Choapa hasta la provincia de Osorno, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.330 m de altitud. También crece en el Archipiélago de Juan Fernández.



Endémico

