

# *Hymenophyllum peltatum* (Poiret) Desv.

HYMENOPHYLLACEAE

Hierba perenne, epífita, a veces terrestre, con rizoma rastrero, ramificado. Pecíolo negruzco, de un cuarto del largo total de la hoja, a veces alado; lámina bipinnada, plana, totalmente glabra, lanceolada a oval-alargada, de 4 a 10,5 cm de largo por 1 a 2,5 cm de ancho; pinnas levemente arqueadas en forma de abanico; raquis alado, flexuoso; últimos segmentos dirigidos hacia el ápice de la lámina, ápice truncado con el margen dentado. Soros 1 a 5 por pinna, fuertemente arqueados en la base, indusios bivalvos, más o menos ovoides a semicirculares, de base cuneiforme, enteros, receptáculo delgado, cilíndrico, alcanzando tres cuartos de la longitud del indusio.

**Caracteres relevantes:** Hojas con la lámina bipinnada, plana, totalmente glabra; raquis alado, flexuoso; últimos segmentos dirigidos hacia el ápice de la lámina, con el margen dentado. Soros fuertemente arqueados en la base, protegidos por indusios bivalvos, más o menos ovoides a semicirculares, enteros.

Especie cosmopolita, muy variable. En Chile se encuentra principalmente desde la provincia de Arauco hasta la provincia Antártica Chilena, desde casi el nivel del mar hasta los 1.350 m de altitud y en los bosques relictos de Fray Jorge y Talinay en la provincia de Limarí. En lugares similares se encuentra también *Hymenophyllum tunbridgense* (L.) Sm.



