

# *Ochagavia carnea*

(Beer) L.B. Sm. & Looser

## Cardoncillo

**Floración:** 

**Fructificación:** 

**Familia:** Bromeliáceas. Monocotiledóneas.

**Origen geográfico:** Endémica de Chile.

**Distribución en Chile:** Regiones de Valparaíso a la de La Araucanía.


**Estado de conservación:** Vulnerable (Hoffmann y Flores, 1989).

**Descripción:** Hierba perenne de porte arbustivo, de tallo corto y hojas en rosetas, que alcanza a 50 cm de altura y un diámetro variable. Hojas algo duras, de 1-2 cm de ancho y hasta 70 cm de longitud, acuminadas, verdes por la haz y pulverulentas por el envés, de margen aserrado, espinoso. Inflorescencia globosa, central, de 7 cm de diámetro, con numerosas flores con tépalos rosados; las brácteas de la inflorescencia son rosadas, y más cortas que los sépalos; en el androceo los estambres con las anteras amarillo-anaranjadas, alcanzan los 5 cm de longitud y sobresalen de las flores. Florece en verano. Fruto, una baya, madura a comienzos de otoño.

**Hábitat:** Crece sobre roqueríos húmedos o en cortes a orillas de ríos, prefiere los desniveles pronunciados.

**Propagación:** Se propaga por semillas sembradas en primavera en almáximo normal o estratificado en otoño. Vegetativamente se puede multiplicar a comienzos de primavera por división de las matas.

**Utilización:** En paisajismo se utiliza para formar rocallas húmedas; también se planta en laderas y taludes o en macetas. Llamen la atención su textura y su gran inflorescencia central.



\* Hoffmann, A.E. & A. Flores. 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En I. Benoit Ed. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-127.

