

Clinopodium multiflorum

(Ruiz. et Pav.) Kuntze

(*Satureja multiflora* (Ruiz & Pav.) Briq.)

Poleo en flor, satureja, melahuén

Floración:



Fructificación:



Familia: Lamiáceas (Labiadas).

Origen geográfico: Endémica de Chile

Distribución en Chile: Regiones del Bío-Bío a la de Los Lagos.

Estado de conservación: especie clasificada como casi amenazada de extinción.

Descripción: Arbusto siempreverde, ramas decumbentes, delgadas, de hasta 1 m de largo, sus ramas se apoyan sobre otros arbustos para llegar a la luz. Hojas pecioladas, aovadas, de hasta 4 cm de longitud obtusas, verdes por la haz y punteadas por el envés, márgenes almenados. Flores rojas, tubulares, bilabiadas, axilares, en grupos de 4 a 7, cáliz bilabiado con el labio posterior bidentado y el anterior tridentado; corola de 3 cm de longitud, arqueada con el labio posterior obtuso y algo escotado y el anterior con 3 lóbulos obtusos, 4 estambres desiguales, 2 de ellos, los más largos, y el estilo sobresalen del tubo floral. Florece en verano. Fruto, un nuculanio formado por cuatro nuecesitas, madura en otoño.

Hábitat: Crece en terrenos húmedos, muchas veces en pendientes fuertes, a pleno sol o en semisombra.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en otoño en un almácho estratificado. De modo vegetativo se multiplica por esquejes en verano, estacas en invierno o mugrones durante todo el año; en todos los casos con hormonas para que arraiguen.

Utilización: En jardines se planta en la parte superior de declives para que cuelgue por ellos, también como planta colgante en macetas, jardineras o en balcones para formar cascadas florales. En medicina alternativa se utiliza como laxante.



