

Ugni candollei

(Barnéoud) O. Berg

Murta blanca, tautau, chauchau, trautrau

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Mirtáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de 0,5 a 0,8 m de altura por similar diámetro. Ramas flexibles, primero ascendentes y luego se curvan hacia el suelo, las más nuevas con vellos rojizos. Hojas coriáceas, cortamente pecioladas, opuestas, ovaladas, enteras y agudas, verde oscuras por la haz, más claras y con vellos rojizos por el envés. Flores largamente pediceladas, péndulas, solitarias, nacen en la axila de las hojas; cáliz con 5 sépalos; corola con 5 pétalos blancos, grandes y redondeados; androceo con numerosos estambres; gineceo con ovario ínfero, estilo y estigma más largos que los estambres. Florece durante el verano. El fruto es una baya ovalada, madura en otoño y es comestible.

Hábitat: Crece en los márgenes o en los claros de los bosques, en condiciones de semisombra, en suelos húmedos, ricos en materia orgánica y con pH levemente ácido. Se encuentra en las terrazas del litoral y en sitios a baja altura en la cordillera de la Costa, en bosque de *Nothofagus glauca* (hualo) o *N. obliqua* (roble).

Propagación: Se propaga en otoño mediante semillas extraídas de frutos macerados por 15 días en agua fría y sembradas de inmediato en almácigos estratificados. De manera vegetativa se pueden multiplicar por esquejes apicales o subapicales, con hormonas para que enraícen, en cama fría durante el verano, o bien por separación de hijuelos de raíz a fines de invierno.

Utilización: En paisajismo se utiliza como parte de macizos arbustivos bajos, para bordear caminos y senderos, plantado en laderas o declives o cultivado en macetas y jardineras. El fruto es comestible.



