


❖ *Hypnum chrysogaster* Müll. Hal.



Plantas medianas de elegante aspecto, verde-amarillentas, postradas, pinnadas, escasamente heterófilas con tallos de hasta 5 cm de longitud. Hojas fuertemente curvadas y giradas hacia un lado de ápices largos delgados y subenteros; hojas del tallo de 1,5 mm de longitud, 0,7 mm de ancho gradualmente angostadas hacia el ápice desde una base escasamente acorazonada; márgenes erectos a levemente incurvados; células de la lámina media de 5 a 6 μm de ancho, la mayor parte de ellas de 60 a 80 μm de longitud; células basales de paredes más gruesas y porosas, hasta 25 μm de longitud y 10 μm de ancho, anaranja-

das; región alar con un grupo de células pequeñas, romboidales de 20 μm de longitud y 25 μm de ancho, situadas en la base de la aurícula; hojas de las ramificaciones de 1,0 mm de longitud, 0,35 mm de ancho, levemente o no acorazonadas en la base, grupo en la región alar, por lo general rojizo con unas pocas células pequeñas arriba y escasamente alargadas abajo. Periquecio lateral. Seta de 17 mm de longitud aproximadamente. Cápsula levemente inclinada, curvada y lisa; urna de 2 mm de longitud; peristoma doble con cilios; esporas de 17 a 20 μm de diámetro, levemente papilosas; opérculo cónico. Caliptra cuculada, desnuda. ■

Familia: Hypnaceae

Observaciones:

La especie está aparentemente restringida a Chile, Patagonia y Archipiélago de Juan Fernández; su distribución en el territorio va desde la Provincia de Valdivia en la Región de los Ríos, hasta la Provincia de Aysén en la Región de Aysén.

