

❖ *Hypopterygium didictyon* C. Müll.



Plantitas dioicas, pequeñas, verde amarillentas; tallos secundarios de 3 a 6 cm de longitud. Estípote breve, de 2 a 3 cm de longitud, generalmente denso–tormentoso en toda la longitud y con hojas distantes, luego ascendentes u horizontales, pinnado o bipinnado ramosos, formando una fronde oblongo–triangular a redondeada. Hojas del estípote adpresas en la base, patentes, ovado–orbiculares, apiculadas, márgenes enteros, con limbo poco definido, nervio rudimentario o ausente; hojas de la parte media del tallo secundario más o menos imbricadas, simétricas o algo asimétricas, ancho–ovadas, acuminadas, casi tan

largas como anchas, de 1,4 a 1,6 mm de longitud por 1,3 a 1,5 mm de ancho máximo, márgenes finamente dentados o enteros, nervio subexcurrente, hojas rameales dorsales dísticas, deflexas al estado seco, asimétricas, ovadas, brevemente apiculadas, de 1,3 a 1,7 mm de longitud por 0,7 a 1 mm de ancho máximo, márgenes dentados en el ápice, nervio subexcurrente. Seta recta, curvada en el ápice, lisa, de 15 a 20 mm de longitud; cápsula horizontal a inclinada, oblongo–ovoidea, de 2 a 2,5 mm por 1 mm, opérculo largo–rostrado, calíptro acumulada, de 3,5 mm de longitud; esporas globosas, ásperas, diámetro 13 a 17 μ . ■

Familia: Hypopterygiaceae

Especie endémica

Observaciones:

Esta especie crece generalmente sobre el piso del bosque o troncos en descomposición en lugares muy húmedos y sombríos, asociado principalmente al musgo *Hypopterygium arbuscula*. Crece desde la Región de la Araucanía al Cabo de Hornos.

