

Scaptia lata

(Guérin-Ménéville, 1835)

Colihuacho, Tábano,
Moscardón

Orden: **Diptera**

Familia: **Tabanidae**



Descripción General

Tabánido grande con 16 mm de largo por 8 mm de ancho, negro brillante con la parte apical del abdomen aplastado y recto, cubierta por abundantes pelos amarillo anaranjados. La parte inferior de la cabeza presenta una pilosidad similar. Hembras mayores que los machos, con 15 a 19 mm de largo. Cabeza negra con pelos naranjos en su base y en la barba; ojos negros con abundante pilosidad castaña, frente con pilosidad gris. Tubérculo ocelar poco pronunciado, con 3 ocelos; probocis membranosa. Patas negras. Alas hialinas grises de 14 a 16 mm de largo; venación castaño oscura a negra.

Machos miden 15 a 17mm de largo, con pelos amarillo anaranjados también en la cara. Ojos contiguos, más pilosos que en la hembra. Tubérculo ocelar muy convexo con 3 ocelos bien desarrollados.

Hábitat y rol trófico

Las hembras oviponen sobre la madera descompuesta dentro de la cual emergen las larvas disponiendo de un amplio espectro de presas, básicamente invertebrados. La pupación se efectúa en lugares menos húmedos. El período pupal puede durar entre 19 y 25 días. Es probable que presenten dos generaciones al año.

Las hembras hematófagas y los machos nectívoros habitan lugares pastosos, húmedos, boscosos que usualmente no se inundan; las larvas depredadoras bajo troncos y piedras rodeadas de vegetación herbácea con abundante humedad.

