

Syllitus elguetai

Cerda, 1991

Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae



Descripción General

Su longitud es de 5,0 mm, cuerpo de color café rojizo, al igual que las antenas y tibias; los élitros son de color gris verdoso. Presentan pilosidad blanquecina y esparcida en la cabeza, élitros y más abundante en el abdomen. Se observa mayor tamaño de las hembras (longitud 5,6 mm) y las antenas más cortas que en los machos.

La cabeza es bastante ancha y voluminosa en relación al protórax, fuertemente convexa, prolongada hacia adelante en una especie de rostro; la parte posterior de la cabeza forma una especie de cuello. Los ojos son redondeados, pequeños, salientes y fuertemente facetados. Las antenas son filiformes y no alcanzan el ápice de los élitros. El pronoto es alargado, de forma cilíndrica con una estrangulación anterior y con la superficie finamente rugosa; los márgenes laterales presentan tubérculos de ápice romo. Ventralmente se observa que el proceso proesternal es de tipo lameliforme y enterrado entre las coxas anteriores.

Las patas son delgadas y las posteriores son más largas que las otras. Los élitros son convexos, con el ápice ligeramente redondeado; la superficie dorsal de cada élitro lleva cuatro costillas longitudinales y los espacios intercostales están cubiertos de puntuación gruesa y densa. El abdomen es alargado y el quinto segmento lleva el margen apical redondeado.

Hábitat y rol trófico

Respecto a su ontogenia no existen antecedentes. Solamente ha sido descrita en el Parque Nacional Nahuelbuta sobre araucaria.

Corre riesgo de extinción debido a su distribución muy restringida. Se desconocen antecedentes ontogenéticos.

