Annisolabis annulicornis
(Blanchard, 1851)

Tijereta

Orden: Dermáptero
Familia: Labiidae

Descripción General
Tijereta de tamaño medio (12 a 14 mm). Cuerpo café oscuro brillante desprovisto de alas; patas amarillas con bandas cafés; con fórceps (tenazas) gruesas y cortas. Especie sin alas. Cabeza pequeña, castaño oscuro, antenas con 14 a 18 segmentos café oscuras usualmente con los segmentos subapicales 3, 4 y 5 amarillo pálido a blanco, aunque algunos individuos muestran uno o ningún segmento claro. Tórax cónico, castaño oscuro. Abdomen algo cilíndrico, castaño oscuro con fórceps anchos, cortos, no cruzados y con el ápice agudo truncado levemente hacia el interior. Patas relativamente cortas, con fémures y tibias amarillos con bandas oscuras.

Hábitat y rol trófico
Las hembras adultas ponen los huevos generalmente en 3 a 4 grupos de aproximadamente 50 huevos durante diferentes estaciones del año. La incubación de los huevos de invierno demora más que la de los huevos de primavera o verano. Durante la incubación la madre protege los huevos de hongos y depredadores. A los pocos días de nacidas, las ninfas abandonan el nido. Pasan entre 45 y 180 días aproximados para que las ninfas alcancen la adultez. Aproximadamente el 75% de la ninfas produce hembras. Vive bajo piedras, palos y otros detritos en ambientes más o menos desprovistos de vegetación boscosa. Habito nocturno. Machos y hembras omnívoros.