Aegorhinus phaletarus
Erichson, 1834

Cabrito del duraznero

Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae

Descripción General
Especie con gran variabilidad morfológica y de aspecto robusto. Cabeza con puntuación profunda y con ojos globosos con arcos superciliares muy elevados y un surco post-ocular profundo. Cuerpo de color negro, revestido con setas y escamas blancas dispuestas en forma de bandas anchas y transversales sobre los elitros; pronoto alargado, con puntuaciones profundas e irregulares. Los adultos están presentes entre octubre y junio. La hembra pone los huevos sobre grietas de la corteza a 10 cm del suelo o bien en el suelo, en grupos de 4 a 5 huevos. La eclosión ocurre después de dos semanas aproximadamente. Para la pupación la larva construye una celdilla más profunda. El ciclo total de desarrollo dura aproximadamente 20 meses. La larva es de color amarillo cremoso.

Hábitat y rol trófico
Sin capacidad de vuelo. Los adultos se alimentan de brotes y hojas; las larvas se alimentan de la corteza y xilema de diversos árboles, produciendo galerías en el interior de la planta. Los adultos ocasionan daño principalmente en la parte aérea de la planta, a través del consumo de la corteza en los brotes tiernos terminales, y la larva se alimenta a nivel del cuello y de las raíces, pudiendo ocasionar la muerte de la planta.

Esta especie se encuentra sobre arbustos frutales introducidos: arándano, frambuesa, grosellero, cerezo, mora, frutillas y sauce. También ha sido encontrada en bosques de roble de la zona central.