Hirmoneura brevirostrata

Bigot, 1857

Nemestrinos

Orden: Diptera
Familia: Nemestrinidae

Descripción General

Nemestrinido con un largo de 20-24 mm y envergadura alar de 50 a 59 mm. Cabeza con rostro negro con micropubescencia amarillenta, ojos cubiertos por escasa micropilosidad blanca, ocelario negro, con cerdas negras, ocelos castaños, área postocular con pelos negros; antenas negras, los dos primeros segmentos con cerdas negras, palpos maxilares castaños oscuros con cerdas negras y micropubescencia blanquizca, proboscis castaña oscura. Tórax con pleura torácica negruzca, con largos pelos negros y un mechón de pelos largos y amarillos pálidos, mesonoto y escutelos negros, con escasos pelos negros, notum con largos pelos amarillos pálidos, alas naranjadas, borde posterior plomizo, venas castañas claras, patas negras con largos pelos negros en la coxa, trocánter y mitad basal del fémur, pelos cortos en el resto de la pata. Abdomen negro con pelos del mismo color surcado en su parte anterior por una banda transversal de pelos amarillos, esternitos abdominales plomizos, con largos pelos amarillo pálidos. Sin dimorfismo sexual.

Hábitat y rol trófico

Aspectos reproductivos desconocidos. Habita en quebradas soleadas tanto de la cordillera de la Costa como la de los Andes, donde se alimenta del néctar de las flores. Especie endémica de Chile.