

Lestes viridis

(Vander Linden, 1825)

Matapojos

Orden: Odonata

Familia: Lestidae



Antecedentes Generales

Se caracteriza por su cuerpo esbelto y vistosos colores metálicos, su tamaño varía entre 40 y 75 mm, con el cuerpo esbelto y las patas finas. Ambos sexos tienen la cabeza alargada transversalmente y los ojos separados. Ambos pares de alas tienen forma y venación similares, y son transparentes, con estigma grande. Los adultos maduros al final de la estación de vuelo presentan tonalidades y brillos cobrizos. El pterostigma es castaño amarillento, siendo más pálido en los individuos recién eclosionados y oscureciéndose en los individuos maduros.

Hábitat y rol trófico

Como el resto de odonatos, son hemimetábolos. Las hembras ponen los huevos en el agua en otoño. Lo hacen acompañadas por los machos (en tándem), en las ramas leñosas de la vegetación ribereña, eligiendo aquellas que sobresalen al agua de ríos o charcas. Dejan en estas ramas unas cicatrices características.

En primavera eclosiona la prolarva, que salta desde las ramas al agua. La larva es depredadora comiendo larvas de mosquitos y otros organismos acuáticos, tardando en desarrollarse desde dos a tres meses. Presentan branquias grandes y externas, al final del abdomen. El periodo de vuelo de los adultos abarca desde diciembre hasta mediados de marzo.

